

QL
1
D67Z
NH

DORIANA

Supplemento agli

ANNALI

) CIVICO DI STORIA NATURALE "G. DORIA,

GENOVA

Vol. IV - N. 185

15 - VII - 1968

POMPEO CALDERONI

Istituto di Zoologia, Idrobiologia e Piscicoltura dell'Università di Perugia
Direttore: Prof. G.P. Moretti

GLI OTOLITI DEL *RUTILUS RUBILIO* BP. DEL LAGO DI BRACCIANO CONFRONTATI CON QUELLI DELLA « LASCHETTA »* DEL LAGO TRASIMENO

Nel corso dei nostri studi morfologici volti a chiarire la posizione sistematica della « laschetta » del Lago Trasimeno sono state prese in considerazione, oltre la stessa « laschetta », anche altre forme ritenute affini ad essa (6,7,8): il *Rutilus rutilus* L. e il *Rutilus rubilio* Bp.

In particolare quest'ultima a cui il BERG (1) ascrive tutte le forme italiane del Genere *Rutilus* Raf. senza distinguere sottospecie e varietà è ora oggetto da parte di questo Istituto di attente osservazioni.

Il TORTONESE in un precedente scambio di vedute (in litteris) mi ha precisato la sua convinzione circa l'identità specifica della « laschetta » col *Rutilus rubilio* Bp. Scopo delle presenti osservazioni è ora quello di mettere in luce le eventuali affinità e differenze morfologiche che possono convalidare o meno la ritenuta identità delle due forme.

A questo riguardo un elemento di valutazione diagnostica abbastanza convincente mi è sembrato l'otolite.

MATERIALI E METODO.

Per la ricerca sono stati utilizzati 62 esemplari del così detto « roviglione » del Lago di Bracciano (*Rutilus rubilio* Bp.) pescati tra l'agosto e il settembre del 1966. Di ciascun esemplare è stata presa la LS. (Lunghezza Standard = Longitudo corporis) e sono state prelevate una ven-

(*) Il nome scientifico della « laschetta » verrà preso in considerazione quando sarà chiarito il genere e la specie a cui essa appartiene.



tina di squame sopra la linea laterale, dietro l'opercolo, per la determinazione dell'età.

Come per la « laschetta », gli otoliti non si sono potuti adoperare per tale determinazione poichè non è stato possibile identificare su di essi quella successione di doppi strati (strato scuro più stretto-strato chiaro più largo), ciascuno dei quali rappresenta il risultato di due precipitazioni annuali di carbonato di calcio: quella autunno-vernina, più esigua, corrispondente allo strato scuro e quella primaverile-estiva, più ampia, corrispondente allo strato chiaro. (4,5,9).

Questa deposizione calcica annuale formata appunto da una serie scura e una chiara, ci esprime, come noto, un anno di vita del pesce.

Come fatto per la « laschetta » (12), gli otoliti sono stati estratti aprendo il capo mediante resezione orizzontale a livello delle orbite.

La « Sagitta » non è stato possibile utilizzarla per la sua estrema fragilità; il « Lapillo » e l'« Asterisco », ripuliti dei residui organici in soluzione di KOH 5% per 48 h. sono stati osservati alla stereolente a 18x.

Data la loro forma pressochè ellissoidale è stato misurato il diametro maggiore (AM.) e quello minore (Am.) di ciascun otolite, derivando da questi il diametro medio (A. med.).

Dopo disidratazione a 120° si è proceduto alla pesatura degli otoliti.

Le medie delle misure relative: alla LS., all'AM., all'Am., all'A. med. e al Ps. (peso dell'otolite), sono espresse, per ciascun sesso e ciascuna classe di età nelle tabelle I e II.

Nelle stesse tabelle, per ciascun sesso, è stata calcolata la media delle diverse osservazioni, e con i valori di tale media si è eseguito il calcolo dei rapporti: Ps./LS., A.med./Ps., A.med./LS. (numeri grandi sulle tabelle).

Nelle tabelle I e II a fianco dei dati summenzionati sono altresì introdotti i corrispondenti dati relativi agli otoliti (« Lapillo » e « Asterisco ») della « laschetta » del Trasimeno, già pubblicate in una mia precedente nota (12).


Nella fig. 1 sono stati disegnati in scala con le misure dei diametri il « Lapillo » e l'« Asterisco » del *R. rubilio* Bp. e della « laschetta ».

RISULTATI E CONCLUSIONI.


Dall'esame delle tabelle I e II risulta che:

a) Il « Lapillo » e « L'Asterisco » del *Rutilus rubilio* Bp. del Lago di Bracciano hanno il diametro maggiore (AM), quello minore

Lapillo



Asterisco



Schizzo morfologico degli otoliti in « laschetta » del Trasimeno e in *Rutilus rubilio* Bp. di Bracciano.

(Am.), quello medio (A.med.) e il peso (Ps.) nettamente superiori ai corrispondenti diametri e al corrispondente peso del « Lapillo » e « Asterisco » della « laschetta » del Lago Trasimeno a tutte le età e in ambo i sessi.

b) I rapporti: Ps./LS., A.med./Ps., A.med./LS., sono superiori in *R. rubilio* Bp. che non in « laschetta ».

Tab. I

Lunghezza Standard (LS.) media, misure medie dell'asse maggiore, dell'asse minore, dell'asse medio e del peso (AM., Am., A. med. e Ps.) dei due otoliti riferite a ciascuna classe di età; rapporti: Ps./LS., A. med./Ps., A. med./LS., nelle femmine della « laschetta » del Trasimeno e del *R. rubilio* Bp. di Bracciano.

Lapillo (♀)

Classi di età	« laschetta »						<i>R. rubilio</i> Bp.					
	Individui	LS. mm.	AM. mm.	Am. mm.	A. med. mm.	Ps. mg.	Individui	LS. mm.	AM. mm.	Am. mm.	A. med. mm.	Ps. mg.
I	15	69,0	0,538	0,422	0,480	0,52	8	81,4	0,628	0,512	0,570	0,47
II	3	96,1	0,671	0,515	0,593	1,20	8	104,5	0,849	0,692	0,770	1,41
III	6	125,0	0,910	0,687	0,798	3,28	8	137,2	1,295	1,118	1,201	4,74
IV	1	131,3	1,028	0,773	0,900	4,00	1	148,0	1,661	1,225	1,443	5,40
V	5	145,1	1,058	0,780	0,919	4,69	5	154,1	1,916	1,536	1,726	6,20
VI	6	154,5	1,072	0,830	0,951	4,71	5	159,0	2,189	1,985	2,087	7,70
tot.	36	721,0	5,277	4,007	4,641	18,40	35	784,2	8,528	7,068	7,797	25,92
media	—	120,1	0,877	0,667	0,773	3,06	—	130,7	1,422	1,178	1,300	4,32
**		Ps./LS. 0,025	A. med./Ps. 0,25		A. med./LS. 0,006			Ps./LS. 0,0033	A. med./Ps. 0,30		A. med./LS. 0,010	

Asterisco (♀)

Classi di età	« laschetta »						<i>R. rubilio</i> Bp.					
	Individui	LS. mm.	AM. mm.	Am. mm.	A. med. mm.	Ps. mg.	Individui	LS. mm.	AM. mm.	Am. mm.	A. med. mm.	Ps. mg.
I	15	69,0	0,620	0,549	0,584	0,43	8	81,4	0,994	0,920	0,957	0,61
II	3	96,1	0,726	0,626	0,676	1,09	8	104,5	1,228	1,170	1,199	0,95
III	6	125,0	1,004	0,870	0,937	1,88	8	137,2	1,609	1,383	1,496	1,87
IV	1	131,3	1,040	0,872	0,956	2,60	1	148,0	1,940	1,648	1,791	3,38
V	5	145,1	1,145	0,949	1,047	3,90	5	154,1	2,154	1,979	2,066	3,83
VI	6	154,5	1,147	0,983	1,065	4,00	5	159,0	2,435	2,282	2,358	5,92
tot.	36	721,0	5,682	4,849	5,265	13,90	35	784,2	10,360	9,382	9,867	16,56
media	—	120,1	0,947	0,808	0,877	2,31	—	130,7	1,726	1,563	1,644	2,76
**		Ps./LS. 0,019	A. med./Ps. 0,33		A. med./LS. 0,007			Ps./LS. 0,019	A. med./Ps. 0,59		A. med./LS. 0,012	

(**) Riferiti ai valori medi del Ps. e della LS.

Tab. II

Lunghezza Standard (LS.) media, misure medie dell'asse maggiore, dell'asse minore, dell'asse medio e del peso (AM., Am., A. med. e Ps.) dei due otoliti riferite a ciascuna classe di età; rapporti: Ps./LS., A. med/Ps., A. med./LS., nei maschi della « laschetta » del Trasimeno e del *R. rubilio* di Bracciano

Lapillo (♂)

Classi di età	« laschetta »						<i>R. rubilio</i> Bp.					
	Indivui	LS. mm.	AM. mm.	Am. mm.	A. med. mm.	Ps. mg.	Indivui	LS. mm.	AM. mm.	Am. mm.	A. med. mm.	Ps. mg.
I	26	74,1	0,571	0,434	0,502	0,70	9	79,8	0,640	0,425	0,532	0,68
II	5	92,2	0,692	0,505	0,598	0,90	6	99,1	0,853	0,600	0,726	1,66
III	3	119,5	0,871	0,603	0,737	2,00	7	116,8	1,300	1,123	1,211	2,85
IV	1	137,5	0,931	0,706	0,818	4,08	2	140,8	1,599	1,320	1,459	6,00
V	* 1	136,5	0,933	0,706	0,819	4,00	3	150,0	1,980	1,500	1,740	6,45
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
tot.	36	559,8	3,998	2,954	3,474	11,68	27	586,5	6,372	4,968	5,668	17,64
media	—	111,9	0,799	0,591	0,695	2,34	—	117,3	1,274	0,993	1,133	3,52
		Ps./LS.	A. med./Ps.		A. med./LS.			Ps./LS.	A. med./Ps.		A. med./LS.	
		0,021	0,25		0,006			0,030	0,32		0,010	

Asterisco (♂)

Classi di età	« laschetta »						<i>R. rubilio</i> Bp.					
	Indivui	LS. mm.	AM. mm.	Am. mm.	A. med. mm.	Ps. mg.	Indivui	LS. mm.	AM. mm.	Am. mm.	A. med. mm.	Ps. mg.
I	26	74,1	0,643	0,550	0,596	0,58	9	79,8	0,989	0,800	0,894	0,41
II	5	92,2	0,758	0,644	0,701	0,87	6	99,1	1,288	1,100	1,194	1,45
III	3	119,5	1,011	0,822	0,916	1,96	7	116,8	1,637	1,499	1,568	1,86
IV	1	137,5	1,213	1,061	1,137	2,08	2	140,8	1,971	1,605	1,788	2,08
V	* 1	136,5	1,218	1,058	1,138	2,10	3	150,0	2,242	2,060	2,151	2,83
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
tot.	36	559,8	4,843	4,135	4,488	7,59	27	586,5	8,137	7,064	7,595	8,63
media	—	111,9	0,968	0,827	0,897	1,52	—	117,3	1,627	1,413	1,520	1,72
		Ps./LS.	A. med./Ps.		A. med./LS.			Ps./LS.	A. med./Ps.		A. med./LS.	
		0,014	0,59		0,007			0,015	0,88		0,013	

(*) I dati sono puramente indicativi data la scarsezza degli elementi, ma sono stati introdotti per far vedere che nei maschi della « laschetta » V e VI anno sono assai vicini fra loro come misure in lunghezza.

Come per la « laschetta » si osserva invece che in *R. rubilio* Bp.

a) Il diametro medio (A. med.) del « Lapillo » è sempre inferiore a quello dell'« Asterisco ».

b) Il peso medio (Ps.) dell'« Asterisco » è sempre inferiore a quello del « Lapillo ».

c) L'accrescimento dei due otoliti segue di pari passo l'accrescimento in lunghezza del pesce.

Pertanto sebbene la relativa esiguità dei soggetti a nostra disposizione ci conduca ad una prudentiale valutazione, cionondimeno parrebbe plausibile ritenere che gli otoliti del *R. rubilio* Bp. del Lago di Bracciano (« Lapillo » e « Asterisco ») siano in effetti più grandi e più pesanti dei corrispondenti della « laschetta » del Lago Trasimeno, anche se essi, per quanto riguarda la sagoma sono sostanzialmente uguali nelle due popolazioni.

Il rilievo potrebbe essere meglio evidenziato dal più alto rapporto: A. med./LS. in *R. rubilio* Bp. rispetto alla « laschetta ». (« Lapillo »: 0,010, « Asterisco: 0,012-0,013 in *R. rubilio* Bp.) (« Lapillo »: 0,006, « Asterisco »: 0,007 in « laschetta »).

BIBLIOGRAFIA

- (1) BERG L.S. - 1932 - Übersicht der Verbreitung der süßwasserfische Europas. - *Zoogeographica* Leipzig, I, (2), pp. 107-208.
- (2) CALDERONI P. - 1964 - Aspetto morfologico degli otoliti in *Rutilus rubilio* Bp. del Lago Trasimeno (Cypriniformes Cyprinidae). - *Boll. Zool.*, XXXI, (2), pp. 973-981.
- (3) CIANFICCONI F. - 1959 - Il regime dietetico estivo della lasca del Trasimeno (*Rutilus rubilio* Bp. v. *rubella* - *trasimenicus*). - *Boll. Zool.*, XXVI, (2), pp. 607-613.
- (4) CIANFICCONI F. - 1960 - Nuovo contributo alla conoscenza del regime dietetico della lasca del Trasimeno (*Rutilus rubilio* Bp. v. *rubella-trasimenicus*). - *VII giornate veterinarie sui prodotti della pesca*.
- (5) CIANFICCONI F. - 1961 - La biologia della lasca del Lago Trasimeno. - *Verh. Internat. Verein Limnol.*, XIV, pp. 182-184.
- (6) CIANFICCONI F. - 1963 - Areale italico del *Rutilus rubilio* Bp. - *Arch. Bot. Biogeogr. Ital.* (39 IV serie), VIII, (4), pp. 1-4.
- (7) FIGUERAS A. - 1955 - Datos sobre la edad y crecimiento de la pescadilla (*Merluccius merluccius* L.) de levante determinados por medio de los otolitos. - *Investigacion Pesquera*, I, pp. 3-15.
- (8) FIGUERAS A. - 1963 - Edad y crecimiento del Bacalao de las costas de Groenlandia en 1958. - *Investigacion Pesquera*, XXII, pp. 111-123.
- (9) GRASSÉ P.P. - 1958 - Traité de Zoologie, Agnathes et poissons, XIII, (2), pp. 1070-1082.

- (10) GRASSÉ P.P. - 1958 - Traité de Zoologie, Agnathes et poissons, XIII, (3), pp. 1835-1842.
- (11) LAGLER K.E., BARDACH J.E., MILLER R.P. - 1962 - Ichthyology. - Ed. John Wiley and sons Inc., New York, pp. 104-106.
- (12) POLIMANTI O. - 1944 - Sul contenuto in calcio degli otoliti di Anguille (*Anguilla anguilla* L.) di varie regioni d'Europa. - *Riv. Idrobiol.*, XXXVII, pp. 105-108.

RIASSUNTO

Vengono esaminate la morfologia e la morfometria degli otoliti: «Lapillo» e «Asterisco» del *Rutilus rubilio* Bp. del Lago di Bracciano e confrontati con quelli della «laschetta» del Lago Trasimeno. L'Autore conclude che «Asterisco» e «Lapillo» sono più grandi e più pesanti in *R. rubilio* Bp. che in «laschetta», ferma restando la proporzionalità degli incrementi dimensionali degli otoliti stessi con gl'incrementi dimensionali dei soggetti.

SUMMARY

The Author examines the morphology and the morphometry of the Otolithes: «Lapillo» and «Asterisco» of the *Rutilus rubilio* Bp. from the Bracciano Lake and of the «laschetta» from the Trasimeno Lake.

The Author comes to the conclusion that: «Lapillo» and «Asterisco», are more bigger and heavier in *R. rubilio* Bp. than in «laschetta», unaltered remaining the ratio of the dimensional increases of the otolithes with the dimensional growth of the subjects.
